SMANJENJE RIZIKA OD INFEKCIJE
KOD MIJELOMA

IMUNOGLOBULINSKE NADOMJESNE TERAPIJE

1 Šta su imunoglobulini?

Imunoglobulini su proteini antitijela koje proizvodi tijelo za borbu protiv infekcija.




2 Zašto su oni važni kod mijeloma?

Mijelom i njegove terapije, posebno bispecifična antitijela i CAR T-ćelijska terapija, uzrokuju nizak nivo imunoglobulina. Niski nivoi imunoglobulina dovode do povećanog rizika od infekcije.

3 Koje terapije postoje za nizak imunoglobulin?

Imunoglobulinska nadomjesna terapija preporučuje se kada su nivoi imunoglobulina (IgG) ispod 4 g/L i ako imate ponavljajuće infekcije opasne po život[1]. Pacijentima koji uzimaju bispecifična antitijela ili CAR T-ćelijsku terapiju može se propisati imunoglobulinska nadomjesna terapija i prije pojave infekcija, kako bi se one spriječile. Prakse pristupa i propisivanja mogu se razlikovati širom Evrope.

TOvi lijekovi mogu se dati u venu (IV), ili ubrizgati pod kožu (supkutano, SC).



Razgovarajte sa svojim hematologom o imunoglobulinskim nadomjesnim terapijama

MJERE VEZANE ZA STIL ŽIVOTA KOJE MOŽETE PODUZETI

Izbjegavanje gužve

Ponekad je možda potrebno izbjegavati gužve, mjesta i situacije u kojima je dodir s infekcijom vjerovatniji.




Redovno pranje ruku

Redovno perite ruke kako biste smanjili rizik od dobijanja klica koje uzrokuju infekciju.



Maske za lice

Razmislite o nošenju maske za lice tokom perioda u kojima je vaš imunološki sistem jako potisnut.



Personalizirani savjeti

Pitajte svog hematologa o riziku od infekcije, kako ga minimizirati i kako uravnotežiti rizik prilikom posjeta unucima, odlaska na posao, uživanja u hobijima itd.

Obavijestite porodicu i prijatelje da imate povećan rizik

Dajte ljudima do znanja da imate oslabljen imunološki sistem, tako da vaši bliski kontakti mogu poduzeti mjere opreza kako bi spriječili širenje infekcija na vas.



MPE Myeloma Patients Europe

Mijelom u BiH

Referenca: 1. Raje i sar. 2022

+387 61 130 408 Dolina 1, 71000 Sarajevo info@mijelom.ba