RIZIK OD INFEKCIJA KOD MIJELOMA
I LIJEČENJA MIJELOMA

Pacijenti s mijelomom imaju 5 puta veću vjerovatnoću dobijanja infekcija
u poređenju s populacijom iste dobi[1]

Infekcija je ulazak klice u tijelo i njihovo množenje, koje čini da se osjećate bolesnim



1
Mijelom je rak imunoloških ćelija (plazma ćelije).

2
Mijelom i njegovo liječenje **remete imunološki sistem**


3
Slabiji imunitet vodi do **povećanog rizika od infekcije**

Kako liječenje mijeloma smanjuje imunološku funkciju?


Niži nivo antitijela
proteina koji se bore protiv infekcije)



Smanjuje broj imunoloških ćelija
koje se bore protiv bakterija i virusa



Oštećuje prirodne barijere,
kao što su koža i crijeva, koji drže klice podalje



BISPECIFIČNA ANTITIJELA I CAR T-ĆELIJSKA TERAPIJA I RIZIK OD INFEKCIJE

Pacijenti koji primaju bispecifično antitijelo ili su podvrgnuti CAR T-ćelijskoj terapiji, imaju **ozbiljan rizik od infekcije**.

Ovi lijekovi mogu smanjiti nivoe antitijela i uzrokovati da imunološki sistem bude manje aktivan.

To dovodi do povećanog rizika od infekcije, posebno tokom terapije.



RAZGOVARAJTE O VAŠEM RIZIKU OD INFEKCIJE I KAKO GA MINIMIZIRATI, S VAŠIM HEMATOLOGOM

Rizik od infekcije je jedinstven za vas...

Svako ima različit rizik, ovisno o jedinstvenim faktorima koji uključuju...



Dob



Ranije infekcije



Prethodno postojeća zdravstvana stanja kao što su dijabetes ili srčana bolest

i može se mijenjati s vremenom

NAJNIŽI RIZIK
obično je tokom **remisije ili terapije održavanja**

NAJVIŠI RIZIK
obično je prilikom **prve dijagnoze i relapsa**

Mijelom u BiH

MPE Myeloma Patients Europe

Referenca: 1. Blimark i sar. 2024

+387 61 130 408 Dolina 1, 71000 Sarajevo info@mijelom.ba